

Impfstoff für Sojabohnen

Zur Impfung von Sojabohnensaatgut

Diese 400 g Packung ist ausreichend für die Behandlung von einem Hektar Sojabohnensaatgut.

Nettogewicht	400 g Hochwertiges sterilisiertes Beimpfungsmittel auf Torfbasis mit einzigartigem integriertem Sticker (Klebstoff) und Safener
Gebrauchsanweisung	HISTICK® ist luftdicht verschlossen. Nach Öffnung den Inhalt durch leichtes Drücken verteilen. Dieses Produkt enthält mindestens 1×10^9 vitale Zellen von <i>Bradyrhizobium japonicum</i> pro Gramm.
<u>Feucht-Impfung</u>	Das Saatgut mit etwas Wasser leicht anfeuchten (ca. 2 ml pro kg). Danach das Saatgut gründlich mit Beimpfungsmittel vermischen, so dass es gleichmäßig ummantelt ist.
<u>Trocken-Impfung</u>	Eine ausreichende Menge an Beimpfungsmittel auf eine dünne Schicht Saatgut in der Drillmaschine auftragen, dann gründlich vermischen.
<u>Suspensions-Impfung</u>	Mischen Sie 800 ml sauberes, chlorfreies Wasser mit jeder Packung Impfstoff in einen Behälter, bis Sie eine klumpenfreie Suspension erhalten. Ohne dass der Impfstoff sich absetzen kann, schütten Sie die Mischung auf das Saatgut und rühren Sie durch, bis das Saatgut gleichmäßig überzogen ist. Kein übermäßiges Verrühren!
Wichtige Hinweise	Bei Saugluftgeräten wird die Feucht- bzw. Suspensions-Impfung empfohlen. Restmengen einer Packung nicht aufbewahren, sondern mitnutzen.
Anwendung auf gebeiztem Saatgut	HISTICK® Impfstoff ist kompatibel mit Beizmitteln, welche auf Carbathiin, Metalaxyl, Captan, Thiram, Thiabendazole, Streptomycin und Carboxin basieren. Impfstoff nur anwenden, wenn das gebeizte Saatgut völlig trocken ist. Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an den BASF Beratungsdienst.
Vorsichtsmaßnahmen	<ul style="list-style-type: none">• HISTICK® nach Ablauf des Verfallsdatums oder unsachgemäßer Lagerung nicht mehr verwenden.• Das Beimpfungsmittel und das damit behandelte Saatgut kühl lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen und baldmöglichst aussäen.• Sollte die Aussaat nicht binnen 24 Stunden erfolgen, muss das Saatgut erneut beimpft werden.• Lagertemperatur: 2 - 8 °C• Vor <u>Unterschreiten</u> der folgenden Temperatur schützen: 2 °C Die Eigenschaften des Produktes können sich verändern, wenn der Stoff/das Produkt unterhalb der angezeigten Temperatur über einen längeren Zeitraum gelagert wird.

- Vor Überschreiten der folgenden Temperatur schützen: 25 °C
Die Eigenschaften des Produktes können sich verändern, wenn der Stoff/das Produkt oberhalb der angezeigten Temperatur über einen längeren Zeitraum gelagert wird.

Schutzmaßnahmen HISTICK® ist nicht toxisch und ungefährlich. Bei der Impfung von chemisch behandeltem Saatgut, sind Schutzmaßnahmen anzuwenden (z.B. Standardschutzausrüstung)
Eine zu hohe Aufwandsmenge des Impfungsmittels hat keine negativen Auswirkungen auf das Saatgut oder die Pflanzen.

Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig.

Mikroorganismen können möglicherweise sensibilisierende Wirkungen verursachen.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

Schutz von Oberflächengewässern (SP1) Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)

Erste-Hilfe-Maßnahmen
Verunreinigte Kleidung entfernen.
Nach Einatmen: Ruhe, Frischluft.
Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen.
Nach Augenkontakt: Mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen.
Nach Verschlucken: Mund ausspülen und 200 bis 300 ml Wasser nachtrinken.
Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen
Symptome: Besondere Reaktionen des menschlichen Körpers auf das Produkt sind uns bis dato nicht bekannt.
Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen).

Abfallbeseitigung Restentleerte Behälter sind dem Sammel- und Verwertungssystem zuzuführen.

Haftungsausschluss Durch sorgfältige Prüfung ist erwiesen, dass das Produkt bei Einhaltung unserer Gebrauchsanweisung für die empfohlenen Zwecke geeignet ist. Das Nutzungsrisiko dieses Produktes liegt einzig bei Ihnen oder Ihrer Firma. Dies gilt bei Einzelanwendung oder in Kombination mit weiteren Produkten. Soweit nach anwendbarem Recht zulässig ist jegliche Haftung auf Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Da die Lagerung und Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegen und wir nicht alle diesbezüglichen Gegebenheiten voraussehen können, schließen wir jegliche Haftung für Schäden aus der unsachgemäßen Lagerung oder Anwendung aus. Für die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Produktinformation beschrieben sind, schließen wir ebenfalls jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus.

Vielfältige Einflussfaktoren können die Wirkung des Produktes beeinflussen. Hierzu gehören z.B. nicht angepasste Lagerung, unzureichende Aufwandmengen, Mischungen mit anderen Produkten, die nicht ausdrücklich von der BASF empfohlen werden oder unsachgemäße Anwendung. Unter ungünstigen Bedingungen kann deshalb eine Minderung in der Wirksamkeit des Mittels nicht ausgeschlossen werden. Für solche Folgen können wir oder unsere Vertriebspartner keine Haftung übernehmen.

Etwaige Schutzrechte, bestehende Gesetze und Bestimmungen und die Produktinformation sind vom Anwender unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern.

Das Produktionsdatum befindet sich in Verbindung mit der Chargen-Nr. auf dem Gebinde.

BASF SE
67056 Ludwigshafen
Notfall: Tel: (+49) 621/ 60-4 33 33

Vertrieb

BASF SE
Speyerer Straße 2
67117 Limburgerhof